



## Što očekivati u toku i nakon endodoncije?

Endodoncija je postupak koji obuhvaća vađenje upaljene ili odumrle pulpe ("živca"), te punjenje nastalog praznog prostora bioinertnim materijalom.

U slučaju da je zub endodontski obrađen nedugo nakon početka upale, te ako upalni proces nije zahvatio tkiva oko korijena zuba, endodontski zahvat može biti završen u 1-2 posjete. Popratni bolovi nakon takvog zahvata najčešće su minimalni. U takvim slučajevima može se popiti blaga tableta protiv bolova (Andol, Lekadol, Lupocet).

U slučaju da je upalni proces zahvatio tkiva oko zuba, upala dugo traje ili je uzročnik otporan, endodontski zahvat se produljuje na nekoliko posjeta, s međufazama u kojima se kanali ispiru antisepticima te se u kanale stavlja antiseptični uložak za dezinfekciju. U ovakvim slučajevima bolovi mogu (ali ne moraju) biti jači. Tablete protiv bolova pomažu (Ibuprofen, Neofen, Voltaren), a u rijetkim slučajevima potrebno je ostaviti zub otvorenim na nekoliko dana.

Nakon što je postupak endodoncije završen, zub se opskrbljuje ispunom, a ako nedostaje veliki dio krune, nadogradnjom i krunicom.

Blaga bol i osjetljivost zuba u trajanju do 2 tjedna normalna je reakcija nakon endodontskog zahvata. To je period u kojem imunosni sustav organizma uništava eventualne zaostale mikroorganizme, ili razgrađuje kemijske tvari kojima je zub tretiran a koje mogu u minimalnim količinama preći preko apeksa korijena.

Ovakav zub može kod nekih ljudi trajati jednako dugo kao i "živi" zub. Ipak, treba biti svjestan da je takav zub krhkiji i slabiji od živog zuba te pod jakim opterećenjem lakše puca od vitalnih zubi. Endodontski liječen zub ne treba posebno štediti, u smislu da treba izbjegavati žvakati na njega. Jedino na što se treba pripaziti su prednji zubi, kojima ne bi trebalo odgrizati velike zalogaje tvrde hrane.

Pod uspješnom terapijom smatramo uspješnu restauraciju funkcije zuba na 5 godina i duže. Uspješnost terapije je 70-90 %.